

คำนำที่มจัดทำ

คำนำที่มจัดทำ

จากประสบการณ์การป้องกันการใช้ยาเสพติด
เราเข้าใจดีว่ายาเสพติดไม่ได้ทำร้าย
เฉพาะร่างกายและจิตใจของบุคคลเท่านั้น
แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวเป็นอย่างมาก
ทั้งยังก่อให้เกิดการต้านความปลอดภัยและการพัฒนาของสังคม
ประสบการณ์มากมาย
เตือนเราว่าอันตรายจากยาเสพติดนั้นไร้พรมแดน
และเป็นปัญหาระดับโลก เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาในสถานศึกษาพบกับอาจารย์และนักศึกษาต่าง
ชาติ มีเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมยาเสพติดที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
เพิ่มระดับความปลอดภัยภายในสถานศึกษา จึงได้จัดทำ คู่มือแนะน
าการป้องกันการใช้ยาเสพติดฉบับภาษาต่างประเทศนี้
เพื่อเป้าหมายที่ว่า สถานศึกษาไร้สารเสพติด
คู่มือการป้องกันการใช้ยาเสพติดและสุขศึกษาฉบับก่อนๆ
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ
อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบคู่มือฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ป้องกันการใช้ยาเสพติดให้อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ
วัตถุประสงค์ของคู่มือเล่มนี้คือเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด
และเพื่อให้ชาวต่างชาติ
ใช้คู่มือนี้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด

การป้องกันยาเสพติด และเพื่อให้เข้าใจ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาเสพติดในได้
หวั่น นอกจากนี้ คู่มือเล่มนี้ยังมีข้อมูลการบำบัดยาเสพติด
โดยหวังว่าอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจะได้ ประโยชน์จากข้อมูลทีจ
ำเป็นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจำกยาเสพติด
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
เรายินดีตอบทุกข้อสงสัยและรับคำแนะนํำ จากท่านอย่างจริงจัง
ทีมงานของเราจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างสุดความสามารถ

ด้วยความเคารพอย่างสูง ทีมงานผู้จัดทำ
ำคู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดฉบับภำษำต่างประเทศ
ธันวาคม พ.ศ. 2564

C คู่มือ วรรณคดีป้องกันการใช้ยาเสพติด CONTENTS

1. รู้จักยาเสพติด	1
1. คำนิยาม “ยาเสพติด”	1
2. ประเภทยาเสพติด	1
3. ยาเสพติดและอันตรายที่พบบ่อยในไต้หวัน	2
2. ป้องกันยาเสพติด	9
1. ตื่นตัวเพื่อเลี่ยงอันตราย	9
2. 8 แบบปฏิเสธยาเสพติด	10
3. สัญญาณและความช่วยเหลือสำหรับผู้ติดยา	12
4. รู้จักยาปาร์ตี้ “CHemsex”	13
5. ห้าหลักการเดินทางเข้าออกประเทศ	15
3. แหล่งข้อมูล	16
1. บริการปรึกษา	16
2. แผนการช่วยเหลือ	19
3. เว็บไซต์แหล่งข้อมูล	21

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด

4. กฎหมาย	23
ยาเสพติดที่พบบ่อยและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง	23
การควบคุมไนโตรสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ)	26
5. ถามตอบ	27
Q1. ในฐานะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ฉันควรต้องใส่ใจอะไร ?	27
Q2. ความแตกต่างของบรรทัดฐานเกี่ยวกับกัญชาในสากล	28
Q3. ยาเสพติดกำเนิดใหม่ที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง ?	28
Q4. ส่วนผสมที่มักใช้ทำเป็นของกำพืดคืออะไร ?	29
Q5. การใช้ยานอนหลับต้องระวังอะไร ?	30
Q6. อะไรคือการบำบัดรักษาเพื่อนন্দำนินคดี ?	30
Q7. ในไต้หวัน สามารถพบแพทย์เพื่อบำบัดยาเสพติดด้วยตนเองได้หรือไม่ ?	31

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1

รู้จักยาเสพติด

1. คำนิยาม “ยาเสพติด”

ในได้หวั่น “ยาเสพติด” ตามมาตราที่ 2 ของ “ระเบียบการป้องกันควบคุมอันตรายจากยาเสพติด” หมายถึงผลิตภัณฑ์และสารออกฤทธิ์ทางจิตที่ทําให้เกิดการเสพติด ต้องใช้ต่อเนื่อง และ เป็นภัยต่อสังคม

2. ประเภทยาเสพติด

โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับตามการเสพติด การใช้

และอันตรายต่อสังคม โดยยาระดับ 1 และ 2

มีกัอันตรายมากกว่ายาระดับ 3 และ 4:

- ระดับ 1: เช่นเฮโรอีน มอร์ฟีน โคเคน
- ระดับ 2: เช่นแอมเฟตามีน ยาอี กัญชา
- ระดับ 3: เช่นเคตามีน FM2 เมทิลคาทีโนน (เมียวเมียว)
- ระดับ 4: เช่นโซลพิเดม โพรโพรล (เข้มน้านม)

แบ่งตามคุณสมบัติของยาเสพติด:

- สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง: เช่น แอมเฟตามีน MDMA(ยั่วอิ) MDPV(เกลืออ้าบน้ำ) เมียวเมียว PMMA
- สารหลอนประสาทระบบประสาทส่วนกลาง: เช่นกัญชา กัญชาสังเคราะห์(K2)
- สารออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง: เช่นเฮโรอีน มอร์ฟีน
- สารใช้สูดดม: เช่นแก๊สหัวเราะ ก้าวร่าซ้าง Rush เป็นต้น

3. ยาเสพติดและอันตรายที่พบบ่อยในไต้หวัน

ยาเสพติดระดับ 1



- หลังใช้ผลข้างเคียงคือหายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน มึนงง วิดกกังวล คั่น ความดันโลหิตต่ำเป็นต้น
- เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน หากไม่ได้ใช้ต่อเนื่องจะทำให้เกิดอาการถอนยาอันได้แก่ กระหายน้ำ กระสับกระส่าย หัว น้้ำตาไหล น้้ำมูกไหล เหงื่อออกตอนกลางคืน นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่น ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อเป็นต้น ประมาณ 7-10 วันอาการจึงค่อยๆ หายไป
- เฮโรอีนมีฤทธิ์สูงกว่ามอร์ฟินถึง 10 เท่า และการเสพติดเฮโรอีนนั้นรุนแรงกว่ามอร์ฟิน อาการถอนยาก็รุนแรงเช่นกัน ผู้ที่ติดเฮโรอีนจะมีการติดเชื้อเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ (ตับอักเสบB หรือ C) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หลอดเลือดอักเสบ เป็นต้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ฉีดร่วมกัน (รวมถึงเข็ม หลอดเข็ม สำรละลาย) ในการฉีด ยาเสพติด

ยาเสพติดระดับ 2



(เมทิล)แอมเฟตามีน
(เมทแอมเฟตามีน)

- หลังใช้เป็นเวลานานจะนำไปสู่โรคจิตเภทประสาหัสหลง
มักตำมมาด้วยการทำร้ายตัวเอง และมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
เป็นต้น
- ยาประเภทแอมเฟตามีนมีผลในการระับความอยากอาหาร
มักขายเป็นยาลดน้ำหนักอย่างผิดกฎหมาย
และผู้ใช้ยาจะติดยาโดยไม่รู้ตัว



MDMA(ยาอี)

- ผลข้างเคียงคล้ายกับแอมเฟตามีน การใช้ในปริมาณมากจะท
ำให้เกิดอาการเป็นพิษ รวมถึงอุณหภูมิร่างกายสูง (อาจสูงถึง 43
องศา) ช็อค น้ำ ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะกล้ามเนื้อลายสลายและภาวะไตวายเฉียบพลัน
ในรายที่รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้

ยาเสพติดระดับ 2



กัญชา

- เป็นยาที่เป็นสารออกฤทธิ์หลอนประสาทส่วนกลาง หลังสูบหรือกินจะท
ำให้หัวใจเต้น ตื้อยาและในด้านจิตใจต้องพึ่งยา
เมื่อเกิดอาการติดต้องพึ่งยาแล้ว การหยุดยากะทันหันจะท
ำให้เกิดอาการถอนได้ เช่น เบื่ออาหาร วิดกกังวล กระสับกระส่าย
ซึมเศร้า และนอน ไม่หลับ เป็นต้น
- การใช้กัญชาในวัยรุ่นนํำมาทำให้ไอคิว ความจำ
และความสามารถในการเรียนรู้ลดลง
และฤทธิ์หลอนประสาทของกัญชาจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ผิดปกติ
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนนและอันตรายต่อสาธารณะอื่นๆ
- สตรีมีครรภ์ที่สูบกัญชามีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำหนดและน
้ำหนักตัวของทารกในครรภ์ต่ำ
- นอกจากการสูบแล้ว กัญชามักใช้ในรูปแบบของของเหลว ผสมในน
้ำมันบุหรี่ปัฟไฟ หรือทำเป็นคุกกี้ ซ็อคโกแลต เป็นต้น

**กัญชาถือเป็นยาเสพติดระดับ 2 ในได้หวั่น การ ปลูก ขนส่ง
จ ำหน่าย ใช้หรือครอบครอง
ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย**


ยาเสพติดระดับ 3



เคตามีน (Kตามีน คีตามีน)

- การใช้คีตามีนในทางที่ผิดจะน
ำไปสู่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ซึ่งจะท
ำให้เกิดพังผืดที่ผนังกระเพาะปัสสาวะ ปริมาณลดลง และท
ำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปัสสาวะ บ่อย ปัสสาวะเล็ด
ปวดเวล่ำปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด ในผู้ที่อ่ำการรุนแรงจะมี
ปริมาณปัสสาวะน้อยลง มีอ่ำการบวมหน้า ไตทำงานผิดปกติ
จนอ่ำถึงขั้นผ่าตัดสร้างกระเพาะปัสสาวะใหม่ นอกจากนั
ยังส่งผลต่อการทำงานของการรับรู้ (ความสนใจและความจำ)
และความมั่นคงทางอารมณ์ด้วย

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด



ยาระงับประสาทชนิดเบนโซไดอะซีพีน

- การใช้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการติดยา ต้องพึ่งพายา และอาการต่างๆ เช่น อาการ่วงเหงาหาวนอน การเดินไม่มั่นคง ไม่มีสมาธิจดจ่อ ความจำและการตัดสินใจแย่งลง การตอบสนองแย่ เป็นต้น
- การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยากดประสาทส่วนกลางอื่นๆ มักนำไปสู่อาการมึนงง อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเนื่องจากการสูดดมอำเจียน

ยาเสพติดกำเนิดใหม่

คุณสมบัติ 1: แพ็คเกจบรรจุหลากหลาย

ลดความระแวงระวังของวัยรุ่น

- มักพบบ่อยในรูปแบบผงที่ใช้ผสมชงเครื่องดื่ม
ขายในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือแบรนด์ของตัวเอง หรือยาที่ทำเป็นแคปซูล วั่น ซ็อกโกแลต เป็นต้น เพื่อ ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่น
- สำรออกฤทธิ์คล้ายกัญชาที่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม (K2) ซึ่งฉีดพ่นบนยาสูบ หรือตำกแห้ง แล้วขายเป็นพืชตำกแห้งหรือชาสมุนไพรแบบถุง

คุณสมบัติ 2: มีส่วนประกอบหลากหลายผสมกัน

ไม่บริสุทธิ์และไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

- การผสมยาที่มีผลของยาตรงกันข้ามหรือคล้ายคลึงกันอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อ ร่างกายได้ หากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ผลของยาอาจรุนแรงขึ้นและอาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้

คุณสมบัติ 3: ท การตลาดแบบองค์กร

- ทุกวันนี้การตลาดยาเสพติดกำลังพัฒนาไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และมักจะจัดให้มีการแจกฟรีในครั้งแรก ไม่เพียงแต่ผ่านแก๊งค์หรือการตลาดขององค์กรเท่านั้น แต่ยังผ่านการขายแบบ "ซื้อเป็นกลุ่ม" ซึ่งคนรอบข้างจะชักจูงและหลอกล่อวัยรุ่นให้ติดยา

毒咖啡包?

混合式毒品致死率高!

小心包裝? 幾可亂真!

常混摻2種以上毒品種類, 最常見內含物有K他命、搖頭丸、
甲基安非他命、卡西酮、喵喵及FM2等, 不要好奇嘗試。

**根據法務部
法醫研究所統計**

109年上半年新陳毒品相關死亡案件
共計98件, 平均驗出4種毒品成份。

偽製化包裝?

市售商品: 重新包裝, 有拆封痕跡;
山寨品牌: 沒有拆封痕跡;
自創品牌: 包裝完整, 無製造標示, 各式新
流行圖樣。

毒品戒斷中心24小時諮詢專線

0800-770-885 110

教育部

關心您

ไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ)

- เป็นยาฆ่าทั่วไปแบบสุดคม
ออกฤทธิ์สั่นเกิดผลหลังจกสูดดมประมาณ 15 ถึง 30
วินาทีและกินเวลา 2 ถึง 3 นาที
- ไนตรัสออกไซด์จะส่งผลต่อการผลิตวิตามินบี 12
การใช้ในระยะยาวจะทำให้เกิด
รอยโรคที่เส้นประสาทส่วนปลายและไขสันหลัง อาการต่างๆ
เช่นจะมีอาการเช่น มือขำ เท้าขำ เดินไม่ได้
สูญเสียความรู้สึกสำมมิติโดยสิ้นเชิง
และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิต เช่น ง่วงซึม ซึมเศร้า
หรือสับสนเป็นต้น
- หากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือยาอื่นๆ จะท
ำให้เสี่ยงต่อการเป็นพิษได้ง่าย
และก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ





ป้องกันยาเสพติด

1. ตื่นตัวเพื่อเลี่ยงอันตราย

- ยาเสพติดอาจทำเป็นลูกกวาด ช็อคโกแลต และขนมอื่น ๆ ที่ดูน่ารับประทาน หรือปลอมแปลงเป็นกำแพงของ ถูงซ่า ถูงซ่านม ควรสังเกตว่าสภาพปากของมี ร่องรอยการใช้ซ้ำหรือไม่
- เพื่อนมักจะเป็แหล่งที่มาของยาเสพติด ท้าให้ต้องเผชิญแรงกดดันจากเพื่อนฝูง ให้ใช้บุหรี่ แอลกอฮอล์ หมาก ยาเสพติดและลูกอมพิเศษ เครื่องดื่ม เป็นต้น สามารถใช้วิธีการปฏิเสธตรงไปตรงมา หาข้ออ้าง ออกจากที่ตรงนั้น เปลี่ยน หัวข้อสนทนา พูดเยาะเย้ยตัวเอง กลี้ยกล่อมด้วยความเป็นมิตร เป็นต้น ปฏิเสธ ด้วยน้าเสียงและท่าทางเด็ดขาด
- ห้างไกลที่โอเคจอร์ เช่นอินเทอร์เนตคาเฟ่ ผับ บาร์เหล้า เป็นต้น เพิ่มความระแวดระวัง ไม่รับเครื่องดื่มหรือบุหรี่จากคนแปลกหน้า และอย่าละสายตา จากเครื่องดื่มที่เปิดแล้ว ระมัดระวังเพื่อนของเพื่อน แม้จะเป็นคนที่คุ้นเคย หรือเทศหญิงก็ห้ามไว้ใจเด็ดขาด
- เมื่อมีอากาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียน มองเห็นภาพซ้อนหรือบิดเบี้ยว ร่างกายอ่อนแรงหรือไม่มีแรง ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ เกิด ความวิตกกังวลโดยไม่ทราบสาเหตุ หลอนประสาท เกิดภาพหลอน เป็นต้น

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด

ควรจัดการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

- (1) ฉวยโอกาส รีบออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด
- (2) ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พึ่งพาได้
- (3) โทรแจ้ง 110

2.8 แบบปฏิเสธยาเสพติด

เผชิญหน้ากับการยั่วยุจากเพื่อนหรือผู้ค้ายา ให้พูดตามแบบนี้

• วิธียืนหยัดปฏิเสธ

ฉันไม่ทำเรื่องผิดกฎหมาย

ไม่ได้ ฉันไม่อย่างกเสพจริงๆ

• วิธีบอกเหตุผล

เสพยาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อย่าทำให้ฉันเดือดร้อนเลย

พ่อแม่ฉันเข้มงวดมาก ถ้าพวกเขารู้ละก็ฉันช่วยแน่

• วิธีเยาะเย้ยตัวเอง

ไม่ได้หรอก ฉันกลัวนี่นา ไม่ลองดีกว่า!

ไม่ได้ ฉันมันซี้ซลัดอะ ไม่กล้าเสพหรอก!

• วิธีอ้างขอต้อออกจากตรงนั้น

ดีกแล้ว ฉันต้องรีบกลับบ้านแล้ว ไปก่อนนะ

รู้สึกไม่ค่อยสบาย ฉันกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะ!

• วิธีเกลี้ยกล่อมอย่างเป็นมิตร

เราเป็นเพื่อนสนิทกัน ฉ นไม่อย่างให้เธอกลายเป็นคนท

้าผิดข้อหาเสพยา!

อย่าเสพเลย! ไม่ดีต่อสุขภาพ เราเป็นเพื่อนกัน อย่าลองเลยนะ!

- **วิธีเปลี่ยนหัวข้อสนทนา**

ดูสิ ขนมนี้อร่อยมากเลย

กินนะ! เธอก็ลองกินดูหน่อยสิ!

รายงานข่าววันนี้มีรูปแมวน่ารักมากเลย เธอเห็นหรือยัง?

- **วิธีโน้มน้าวกลับ**

ยาเสพติดเสพติดแล้วมันจะติดนะ แล้วมันเลิกยากมาก

ดูข่าวเมื่อวานสิ ผลลัพธ์ของคนที่เสพยา่ะ

เธอเองก็อย่างเสพติดเลย!

- **วิธีประชดกลับ**


ถ้าเพราะพวกเธอคิดว่าฉันซึ่ซ่ล่าด ฉันเลยต้องกิน

ฉันฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว!

ความมั่นใจในตนเองเป็นทำที่ที่ดีที่สุดที่จะต่อต้านการยั่วยุขอ

งยาเสพติด ในการเผชิญกับยาเสพติด

จงยืนกรานที่จะปฏิเสธ



3. สัญญาณและความช่วยเหลือสำหรับผู้ติดยา

- **สุขนิสัยเปลี่ยนไป**

นอนดึก ไม่นอน ตื่นขึ้นไม่กลับบ้าน กลางคืนกลางวันสลับกันมั่ว
นอนติดกัน 2-3 วัน

- **อารมณ์ไม่มั่นคง**

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ โมโหหงุดหงิดง่าย ตื่นเต้นผิดปกติ
หุดหู่ไร้เรี่ยวแรง
สมาธิแย่

- **พฤติกรรมผิดปกติ**

พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ขว้างปาสิ่งของอย่างไม่มีเหตุผล
สบถคำหยาบ ขาดงาน หนีออกจากบ้าน ออกจากโรงเรียน
แบล็กเมล์หรือบูลลี่กลั่นแกล้ง พูดเรื่อยเปื่อยไม่รู้เรื่อง
มีอาการปัสสาวะบ่อย

- **วัตถุพิเศษ**

ผงแป้ง อุปกรณ์เสพ ถุงซิปล็อค

จะช่วยเหลือผู้ติดยาอย่างไร

- ✓ พิจารณาสุนัข การใช้ชีวิต
- ✓ ให้กำลังใจให้ไปพบแพทย์ รับการตรวจ
- ✓ ลิงก์แหล่งข้อมูล ช่วยเหลือให้พบแพทย์
- ✓ สนับสนุนและเคียงข้าง เป็นคู่หู



4. รู้จักยาปาร์ตี้ “CHemsex”

- (1) นิยาม:ยังเป็นที่รู้จักในนามยา “ปลุกเซ็กส์”
เมื่อมีเพศสัมพันธ์จะใช้ยาร่วมด้วย
เพื่อเพิ่มอารมณ์สัมผัสและความรู้สึกยามมีเพศสัมพันธ์
- (2) สถานการณ์:มักพบบ่อยในกิจกรรมปาร์ตี้หรือการนัดเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต
- (3) ยา: ยาเสพติดที่ไม่ใช้ฝิ่น (เช่น เมทแอมเฟตามีน Kตำมึน ยาไอ
กัญชา น้ำG เมียวเมียว เป็นต้น)
ยาที่พบบ่อยในประเทศคือเมทแอมเฟตามีน
[หากใช้ยาเสพติด + แอลกอฮอล์ อาจมีความเสี่ยงถึงชีวิต!]
- (4) วิธีการ:มักใช้เสฟหรือการฉีดยา (slam) เป็นต้น
- (5) ผล:หลังใช้ยาแล้ว การควบคุมตัวเองต่ำลง ความรู้สึกเพิ่มขึ้น
มีความต้องการทางเพศ เป็นต้น
ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจ ท
ำให้ขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ และอาจท
ำให้เกิดความเชื่อมโยง การมีเพศสัมพันธ์ไปสู่การติดยา
- (6) อันตราย:เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น
เอชไอวี ซิฟิลิส หรือโรค หนองใน เนื่องจากความถี่ในการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด

ห่างไกลเอดส์ ลดอันตรายจากยาปาร์ตี้

ตรวจคัดกรองเอดส์

1. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยาง ควรตรวจคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้ง
3. หากมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดโรค (เช่น ใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น มีเพศสัมพันธ์ กับหลายคน ใช้ยาเสพติด มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น) แนะนำให้ตรวจ คัดกรองทุก 3-6 เดือน



หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

1. ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง
2. เลี่ยงการใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน (รวมถึงหัวเข็ม สำรเจ็อง ภาชนะ)
3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หลายคู่นอนหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า (โดยเฉพาะเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตต้องระวังอย่างมาก!)

ป้องกันด้วยยาPrEP“ก่อน” ติดเชื้อเอชไอวี

สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึง 90% ด้วยการรับประทาน PrEP ที่เสถียรก่อนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง



5. ห้ามหลักการเดินทางเข้าออกประเทศ

Don't Let Yourself Become
the Next Death Penalty Statistic for
**CROSS-BORDER DRUG
SMUGGLING**

Overseas drug smuggling incidents keep increasing.
Several Taiwanese drug smugglers have been sentenced to death in Southeast Asia.



- ×อย่าโลภจนหาเรื่องใส่ตัว
- ×อย่าช่วยคนแปลกหน้าพกพาสิ่งของ
- ×อย่าช่วยคนแปลกหน้าถือสัมภาระ
- ×อย่ารับของต้องสงสัยจากคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท
- ×อย่าละสายตาจากสัมภาระของตัวเอง

3 แหล่งข้อมูล

1. บริการปรึกษา

ศูนย์ป้องกันอันตรายจากยาเสพติดของรัฐบาลในแต่ละเขต(เมือง)

สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาฟรี 24ชั่วโมง:0800-770-885

เนื้อหาที่ให้บริการ:

บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดยาหรือครอบครัวของผู้ติดยา

บริการปรึกษาสอบถาม

ข้อมูล รวมถึงการบำบัดการติดยาเสพติด ตรวจคัดกรองโรคเอดส์
ให้คำปรึกษา

ด้านจิตเวช การรักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

การช่วยเหลือทางสังคม

การฝึกอาชีพและความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน ให้ค

ำปรึกษาด้านการเรียนรู้

แผนลดอันตราย หน่วยงานฟื้นฟูการติดยาเสพติดของเอกชน

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เบอร์ติดต่อกองรุกรการ/
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจเทศบาลเมือง**

กองรุกรการ/กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจเทศบาลเมือง	เบอร์ติดต่อ
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองไทเป	02-23817494
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองนิวไทเป	02-80725454 Ext 4096
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองเถาหยวน	03-3335107
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองไถจง	04-23273875
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองไถหนาน	06-6354531
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองเกาสง	07-2215769
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เมืองจีหลง	02-24252787
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เมืองซินจู๋	03-5242103
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเขตซินจู๋	03-5557953
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเมืองเจียอี้	05-2220772
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตเจียอี้	05-3620220
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตเหมียวลี่	037-356950

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้อาเสพติด

กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตจางฮว่า	04-7615463
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเขตหนานโถว	049-2234302
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตอวี่นหลิน	05-5329033
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเขตผิงตง	08-7336283
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเขตอีหลาน	039-353921
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตฮวาเหลียน	03-8224023
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เขตไถตง	089-334756
กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจ เทศบาลเขตเฟิงหู	06-9278466
กองธุรการสำนักงานตำรวจเขตจินเหมิน	0823-25653
กองธุรการสำนักงานตำรวจเขตเหลียนเจียง	0836-25859 Ext 2102

2. แผนการช่วยเหลือ

“แผนการเงินช่วยเหลือเพื่อบำบัดการติดยา”

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

- เป้าหมายในการช่วยเหลือ: ผู้ที่มีบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ
- รายการช่วยเหลือ: ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนที่นอกเหนือจากที่ประกันสุขภาพครอบคลุม
- จำนวนเงินช่วยเหลือ: ช่วยเหลือเงินอุดหนุนในรายการบำบัดรักษาเฉพาะบางรายการ

(1) 18ปี(รวม)ขึ้นไป: จำกัดวงเงิน3หมื่น5,000

ดอลลาร์ได้วันต่อปี

(2) ต่ำกว่า18ปี: จำกัดวงเงิน4หมื่นดอลลาร์ได้วันต่อปี

สถาบันบำบัดผู้ติดยาที่กำหนดและ
รายชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการบำบัด
ทางเลือก



ข้อมูลติดต่อ
"โครงการพัฒนารูปแบบ
การบริการชุมชนบำบัดผู้ติดยา"



มีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกรุณาติดต่อสายด่วน **ศูนย์ป้องกันอันตรายจากยาเสพติด** ปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง:

0800-770-885

**“แผนการให้ค
ำปรึกษาการป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา”
กระทรวงศึกษาธิการ**

• **เป้าหมายที่ให้บริการ**

จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับกรณีที่เกิด
ำกว่าระดับมัธยมศึกษาแล้วแต่กรณี
สำหรับนักศึกษาที่ใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา

• **เนื้อหาการบริการ**

- (1) ให้ค ำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและกำรบำบัดแบบครอบครั
วสามารถปรึกษาทางไกลผ่านวิดีโอคอลได้
- (2) นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับบริการให้ค ำปรึกษาฟรี 6-8 ครั้ง
หากนักจิตวิทยาประเมินว่าต้องมีการขยายเวล่ำ
เมื่อได้รับการยินยอมแล้วจะเพิ่มรอบกำรให้ค
ำปรึกษาที่เหมาะสม

• **ช่องทางติดต่อ**

(02)7749-5720

**นักศึกษาที่ขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งไปยังโรงเรียน
จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการลงโทษ
ตามกฎหมายของโรงเรียน**



3. เว็บไซต์แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ยาเสพติดในประเทศ

ชื่อเว็บไซต์	ที่อยู่เว็บไซต์
ดูแลสุขภาพ กระทรวงสวัสดิการ	http://www.mohw.gov.tw
ส่วนทรัพยากรต่อต้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ	http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10070
เครือข่ายทรัพยากรการป้องกัน การใช้ยาเสพติดของนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ	http://enc.moe.edu.tw
ค่ายต่อต้านยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม	http://antidrug.moj.gov.tw
กรมตำรวจอาชญากรรม ส งานงานตำรวจ กระทรวงมหาดไทย / ยาเสพติดที่พบบ่อย	https://cib.npa.gov.tw/ch/app/folder/48

เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ยาเสพติดต่างประเทศ

ชื่อสถาบัน	ที่อยู่เว็บไซต์
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	http://www.unodc.org
International Narcotics Control Board (INCB)	http://www.incb.org
World Health Organization (WHO)	http://www.who.int/substance_abuse/en
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)	http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm
National Institute on Drug Abuse (NIDA)	http://www.drug-abuse.gov

4 กฎหมาย

ยาเสพติดที่พบบ่อยและบtlงโทษที่เกี่ยวข้อง

ระดับ	ยาเสพติดระดับ1	ยาเสพติดระดับ2
ยาเสพติดที่พบบ่อย	เฮโรอีน มอร์ฟีน โคเคน	เมทแอมเฟตามีน MDMA กัญชา MDPV คัด
ผลิต ขนส่ง จำหน่าย	โทษประหารชีวิตหรือ จำคุกตลอดชีวิต (ปรับไม่เกิน30 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ปี (ปรับไม่เกิน15 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)
ยั่วยุให้ผู้อื่นใช้	จำคุกไม่ต่ำกว่า3ปี แต่ไม่เกิน10ปี (ปรับไม่เกิน3 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกไม่ต่ำกว่า1 ปี แต่ไม่เกิน7 ปี (ปรับไม่เกิน1 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)
ถ่ายโอน	จำคุกไม่ต่ำกว่า1ปี แต่ไม่เกิน7ปี (ปรับไม่เกิน1 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกไม่ต่ำกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน5 ปี (ปรับไม่เกิน 7แสน ดอลลาร์ไต้หวัน)
ใช้ยา	จำคุกไม่ต่ำกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน5 ปี	จำคุกไม่เกิน 3ปี

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด

มีไว้ในครอบครอง	จำคุกไม่เกิน 3 ปี คุมขังระยะสั้น หรือปรับไม่เกิน 3 แสน ดอลลาร์ไต้หวัน	จำคุกไม่เกิน 2 ปี คุมขังระยะสั้น หรือปรับไม่เกิน 2 แสน ดอลลาร์ไต้หวัน
	น้ำหนักสุทธิ 10 กรัมขึ้นไป จำคุกไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี (ปรับไม่เกิน 1 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)	น้ำหนักสุทธิ 20 กรัมขึ้นไป จำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี (ปรับไม่เกิน 7 แสน ดอลลาร์ไต้หวัน)

ยาเสพติดที่พบบ่อยและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

ระดับ	ยาเสพติดระดับ 3	ยาเสพติดระดับ 4
ยาเสพติดที่พบบ่อย	เคตามีน ไนเมตาซีแพม FM2 เมียวเมียว (4-เมทิลคาทีโนน) กระต่อม	โซลพิเดม ไดอะซีแพม อัลปราโซแลม เข็มฉีดยา (โพรโพฟอล)
ผลิตขนส่งจำหน่าย	จำคุกไม่ต่ำกว่า 7 ปี (ปรับไม่เกิน 10 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกไม่ต่ำกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี (ปรับไม่เกิน 5 ล้าน ดอลลาร์ไต้หวัน)
ยั่วยู่ให้ผู้อื่นใช้	จำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี (ปรับ 7 แสนดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกไม่เกิน 3 ปี (ปรับ 5 แสนดอลลาร์ไต้หวัน)
ถ่ายโอน	จำคุกไม่เกิน 3 ปี (ปรับไม่เกิน 3 แสนดอลลาร์ไต้หวัน)	จำคุกไม่เกิน 1 ปี (ปรับไม่เกิน 1 แสนดอลลาร์ไต้หวัน)

ใช้ยา	ปรับไม่ต่ำกว่า 2หมื่น แต่ไม่เกิน5 หมื่น รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า6 ชั่วโมง ไม่เกิน8 ชั่วโมง	ปรับไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น แต่ไม่เกิน5หมื่น รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า4 ชั่วโมง ไม่เกิน 6ชั่วโมง
มีไว้ในครอบครอง	ปรับไม่ต่ำกว่า 2หมื่น แต่ไม่เกิน5 หมื่น รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า6 ชั่วโมง ไม่เกิน8 ชั่วโมง	ปรับไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น แต่ไม่เกิน5หมื่น รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า4 ชั่วโมง ไม่เกิน 6ชั่วโมง
	น้ำหนักสุทธิ 5กรัมขึ้นไป จำคุกไม่เกิน 2ปี (ปรับไม่เกิน 2 แสนดอลล่าร์ไต้หวัน)	น้ำหนักสุทธิ5กรัมขึ้นไป จำคุกไม่เกิน 1ปี (ปรับไม่เกิน 1 แสนดอลล่าร์ไต้หวัน)
ปัจจุบันไต้หวันมีรายการควบคุมยาเสพติดแต่ละระดับกว่า 600 ชนิด หลายชนิดอาจถูกกฎหมายในประเทศบ้านเกิด แต่ผิดกฎหมายในไต้หวัน		

คู่มือรณรงค์ป้องกันการใช้อาเสฟติด

การควบคุมไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ)

กฎหมายจัดการสารเคมีที่เป็นพิษ

- ถ้ารมีแก๊สหัวเราะในครอบครองอย่างผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 3 หมื่น ถึง 3 แสนดอลลาร์ไต้หวัน
- หากทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเสียชีวิต โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ต่ำกว่า 7 ปี ปรับสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
- ถ้าจำหน่ายแก๊สหัวเราะผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีโทษปรับ 6 หมื่น ถึง 3 แสนดอลลาร์ไต้หวัน และปรับตามจำนวนครั้ง

กฎการรักษาระเบียบสังคม

- ผู้ใช้งานจะต้องถูกคุมขังไม่เกิน 3 วันหรือปรับไม่เกิน 18,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

笑氣根本不好笑!



笑氣學名為「一氧化二氮」或「氧化亞氮」，是一種無色有甜味的氣體。

依「**毒性及腐蝕化學物質管理法**」規定未經核可擅自非法買賣或使用笑氣者，可處新臺幣3萬元至30萬元罰鍰，若因而致人於死或危害人體健康，則懲重可處無期徒刑或七年以上有期徒刑併科罰金最高新臺幣1,000萬元。

愛惜自己與家人 勿以身試法

相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：
諮詢專線 0800-770-885 (請撥分機號碼)

教育部
Ministry of Education
關心您



5 ถามตอบ

Q1. ในฐานะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ฉันควรต้องใส่ใจอะไร ?

- **ใส่ใจกฎสถานศึกษา**

“มาตรการให้รางวัลและการลงโทษนักศึกษา” ในรั้วสถานศึกษามักมีมาตรการในการจัดการกับนักศึกษาที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและฝ่าฝืนกฎ

(เช่น บัณฑิตกระทำผิดหนักหรือให้ออกจากโรงเรียน)

- **พิจารณาถึงอนาคต**

การข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากจะต้องเผชิญกับกฎหมายแล้ว อาจหมดโอกาสในการทำงานในไต้หวันหรือการพ

านักอาศัยในไต้หวัน

(เช่น นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมความร่วมมือทางการศึกษา)

- **ห่างไกลยาเสพติด**

ป้องกันตนเอง รักษาสุขภาพที่ดี



Q2. ความแตกต่างของบรรทัดฐานเกี่ยวกับกัญชาในสากล

ผิดกฎหมายทุกด้าน

ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย

ถูกกฎหมายในทางการแพทย์
หรือเพื่อความบันเทิง

อูรูกวัย ไทย บางรัฐในอเมริกา แคนาดา

Q3. ยาเสพติดกำเนิดใหม่ที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง ?

- Methylone (bk-MDMA)
- Mephedrone(เรียกทั่วไปว่าเมียวเมียว)
- Mephedrone(เรียกทั่วไปว่าเมียวเมียว)
- TFMP (Molly) ฟาร์มา-คลอโรแอมเฟตามีน (เรียกทั่วไปว่า PCA หรือ 4CA)

มักประกอบด้วยคาทีโนนสังเคราะห์

ที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก



Q4. ส่วนผสมที่มักใช้ทำเป็นช่องกาแฟคืออะไร ?

1. PMMA

ผลของยาชา แต่ฤทธิ์แรง ผู้ที่ใช้มักจะคิดว่าฤทธิ์ยาเบา
เมื่อไม่ระวังก็จะเพิ่มปริมาณในการใช้ ขึ้นอีก ท
ำให้ใช้ในปริมาณมากเกินไปจนมีหลายเคสที่ถึงแก่ชีวิต
ปฏิกิริยาอันตรายที่พบบ่อยรวมถึงกระสับกระส่าย หลอน สลบ
ชัก อุณหภูมิร่างกายสูง กล้ามเนื้อล้าลาย
ระบบหายใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นตัน
หรือแม้กระทั่งถึงแก่ ความตาย

2. เมทิลคาลิโนน (เมียวเมียว เมฟีโดรน)

เป็นยาที่มีฤทธิ์เสพติดรุนแรง ผลข้างเคียงมีทั้งใจสัน
ความดันโลหิตสูง และมีอาการทาง
จิตเวช เมื่อหยุดใช้ยาอาจเกิดอาการซึมเศร้า กระสับกระส่าย
ตัวสั่น นอนไม่หลับ อาการ ประสาทหลอน เป็นต้น

Q5. การใชยานอนหลับต้องระวังอะไร ?

ยาควบคุม	การใชยานอนหลับที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์ ถือว่าผิดกฎหมาย
แพทย์สั่งจ่าย	ต้องพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและประเมินโดยละเอียด
ตามคำสั่งแพทย์	ห้ามลดหรือเพิ่มปริมาณยาเอง และห้ามเปลี่ยนเวลากินยาเองเด็ดขาด
เลียงแอลกอฮอล์	เพื่อเลียงผลข้างเคียงรุนแรงของยาที่อาจเกิดขึ้น
สร้างสุขนิสัยการนอน	สร้างวินัยในการนอน ก่อนนอน 2 ชั่วโมงลดการใชอุปกรณ์ 3C
ค่อยๆลดปริมาณ	ห้าหยุดยากะทันหัน ระวังอาการถอนยาหรือการกลับมานอนไม่หลับซ้ำอีก

Q6. อะไรคือการบำบัดรักษาผ่นพันดำเนินคดี ?

เป้าหมาย	ผู้ใชยาเสพติดระดับหนึ่งและสอง
วิธีการ	หลักการคือการพบแพทย์หรือวิธีการอื่นที่เป็นอิสระ ไม่ผูกมัด
รายการ	การบำบัดด้วยยา จิตบำบัด บำบัดฟื้นฟู การตรวจสอบยา มาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของโรคหรือปรับปรุง ความสามารถในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
รูปแบบ	ต้องดำเนินการเข้ารับการบำบัดรักษากับโรงพยาบาลที่ก ำหนดภายในหนึ่งปี และต้องรายงานตัวต่อผู้ดูแลตามก ำหนดพร้อมรับการตรวจปัสสาวะ

Q7. ในไต้หวัน สามารถ

าเนินการพบแพทย์เพื่อเลิกยาเสพติดด้วยตนเองได้หรือไม่?

ได้

กฎหมายการป้องกันอันตรายจากยาเสพติด
การใช้ยาเสพติดระดับ 1 และ 2 ก่อนที่ ผู้กระท
าความผิดจะถูกทราบบ สามารถขอรับการรักษา
บำบัดได้ด้วยตนเองที่สถาบันทาง การแพทย์ที่ก
าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
โดยสถาบันทางการแพทย์จะ
ไม่ส่งผู้ขอรับการรักษาไปยังศาลหรือสำนักงานอัยการ

หากกำลังทุกข์ทรมานจากการติดยาเสพติด
กฎหมายของไต้หวันจะสนับสนุนให้คุณไปพบ
แพทย์ด้วยตนเอง

